

龍崗自然步道—昆蟲

串珠環紋蝶 *Faunis eumeus*



串珠環紋蝶 *Faunis eumeus*

特徵

翅展 ♂ 62~66mm，♀ 66~75mm，翅為黑褐色，翅腹面從前翅至後翅的中央有一串白色斑點，呈帶狀排列，有如一串珍珠排列，此為其蝶名的由來。雌蝶的前翅背面亞外緣有一明顯的橙黃色帶，雄蝶則不明顯。



串珠環紋蝶 *Faunis eumeus*

棲息環境及行為

分布於中國大陸、中南半島及印度，近年內移入，為台灣新紀錄種，一年約4世代，成蟲主要發生期在春末夏初，成蟲常棲息於低地的林間或林緣等日照稀疏環境，嗜食水果腐汁與動物排遺；寄主植物為平炳菝契。



串珠環紋蝶 *Faunis eumeus*

龍崗步道出現季節及分佈情形

分布於龍崗步道A3、A4、C4、D4林間。除2月外皆可見。

大鳳蝶 *Papilio memnon*



大鳳蝶 *Papilio memnon*

【特徵】

展翅100~120mm。雄蝶翅膀以黑色為主，下翅背面有藍灰色放射狀條紋，腹面肛腳具橙色斑；雌蝶斑紋變化大，有的下翅具有尾突。無論雌雄，在翅膀腹面上、下翅基部可見三角形紅色斑，是主要辨識特徵。



大鳳蝶 *Papilio memnon*

【棲息環境及行為】

本種在平地至中海拔山區極為常見，成蟲喜好訪花。



大鳳蝶 *Papilio memnon*

- 龍崗步道出現季節及分佈情形
- 主要出現在步道A2、B2，除冬季外皆可見。

白痔珈蟴 *Matorna basilaris*



白痔珈螳 *Matorna basilaris*

【特徵】

腹部長53～56mm，是台灣豆娘種類中體型最大者。雄蟲胸部、腹部金綠色；翅膀藍色具光澤。雌蟲胸部墨綠色；腹部黑褐色；翅黑褐色稍具光澤，翅痔白色，為此種名稱之由來。

白痔珈螳 *Matorna basilaris*

【棲息環境及行為】

生活在海拔1500公尺以下的清澈小溪環境。成蟲出現於4至12月。

白痔珈蟪 *Materna basilaris*

龍崗步道出現季節及分佈情形

分布於龍崗步道B3、B4溪流附近。

頂脈蜻蜓 *Orthetrum triangulare*



頂脈蜻蜓 *Orthetrum triangulare*

特徵

- 腹部長約33~36mm。雄蟲胸部黑色，翅基黑色，腹部覆有藍灰色粉末；雌蟲胸部有黑黃相間條斑狀，背側中央黃色，翅端不具黑褐色。

頂脈蜻蜓 *Orthetrum triangulare*

【棲息環境及行為】

- 本種是海拔1500公尺以下地區常見種類，成蟲出現於5~10月，生活在池塘、沼澤、師、山等緩流環境。

頂脈蜻蜓 *Orthetrum triangulare*

龍崗步道出現季節及分佈情形

■ 分布於龍崗步道B3溝渠，4～10月出現。

豆芫菁 *Epicauta hirticornis*



豆芫菁 *Epicauta hirticornis*

特徵

體長約14~27mm。體背黑色，頭部橙紅色，有如一顆紅豆，翅鞘末端具灰白色長毛。雄蟲於觸角、各腳均有明顯發達的黑色長毛。

豆芫菁 *Epicauta hirticornis*

【棲息環境及行為】

成蟲於夏季時，在中海拔山區以下山區極為普遍，常成群聚集。

豆芫菁 *Epicauta hirticornis*

龍崗步道出現季節及分佈情形

主要於7~9月出現在C5往D5的步道兩旁。

